

## Epibionty na górnoeifelskich łodygach liliowców z Gór Świętokrzyskich

Edward Głuchowski

*Acta Palaeontologica Polonica* 50 (2), 2005: 315-328

Większość spośród 378 górnoeifelskich fragmentów łodyg liliowców zebranych z dolnej części warstw skalskich w Górach Świętokrzyskich wykazuje ślady drażeń endobiontów, lecz tylko ok. 20% z nich ujawnia ślady epibiontów. Liliowce te należą do pięciu gatunków opisanych na podstawie łodyg: *Tantalocrinus scutellus* Le Menn, 1985, *Schyschatocrinus creber* Dubatolova, 1975, *Gilbertocrinus vetulus* Moore and Jeffords, 1968, *Pentagonostipes petaloides* Moore and Jeffords, 1968 i *Cyclooctocrinus* sp. Zasiadła je 19 gatunków epibiontów żywiących się zawiesiną. Należały do nich otwornice z rodziny Saccamminidae, koralowce Rugosa i Tabulata, ramienionogi z rodzin Cyrtinitidae i Productidae, organizmy opisywane jako 'mszywioly Ctenostomata', 'mszywioly Cylostomata', mszywioly Cystoporata i mszywioly Rhabdomesida?, liliowce oraz organizmy o nieokreślonej przynależności. Większość tych epibiontów była oportunistycznymi komensalami kolonizującymi liliowce za życia, a tylko nieliczne wykorzystywały martwe liliowce jako twarde podłoże do osiedlenia się. Przynajmniej niektóre epibionty wydają się być wybiórcze w doborze gatunku gospodarza.

**Key words:** Epibionts, crinoids, host-selectivity, Skąły Beds, Eifelian, Holy Cross Mountains.

Edward Głuchowski [[egluchow@wnoz.us.edu.pl](mailto:egluchow@wnoz.us.edu.pl)], Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, PL-41-200 Sosnowiec, Poland.



[Full text \(1,106.2 kB\)](#)