

Bryozoaires et environnement récifal dans le Dévonien français

Françoise Bigey

Acta Palaeontologica Polonica 25 (3-4), 1980: 645-654

Bien que dépourvus d'un rôle, prépondérant comme organismes constructeurs, les Bryozoaires sont généralement 'présents dans l'environnement récifal en France au Dévonien. En Normandie (N-E du Massif armoricain) les Bryozoaires existent dans tous les biohermes de l'Horizon récifal de Baubigny (Siegénien). Les colonies de Fénestellides peuvent se présenter en voiles accrochés aux Stromatoporoïdes et aux Tabulés branchus. En Bretagne (W du Massif armoricain) les Bryozoaires constituent un élément important de la faune dans certains niveaux à tendance biohermale à l'intérieur d'une séquence carbonatée comme celle de la Pointe de l'Armorique (Siegénien). Ils paraissent plus rares dans les faciès récifaux des Pyrénées (Couvinien-Givétien). Dans l'Ardenne française, le seul

domaine récifal se 'situe dans la région de Givet. La coupe du Mont d'Hauris (Givétien) a livré des Bryozoaires, surtout en bioclastes. Les horizons de type biostromal se révèlent plus favorables au développement et à la diversification des Bryozoaires que ceux de type biohermal dans le Boulonnais (Givétien-Frasnien).

Key words: Bryozoaires, environnement récifal, Dévonien, France.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.